

A ne pas confondre !

Les Agrions bleus (1/2)

Zygoptères, Coenagrionidés

Erythromma lindenii (Naïade aux yeux bleus)

LC

EN

LC

Coenagrion sp. (Agrion)

Taille : 30-36 mm

Taille : 27-38 mm


Yeux bleu vif




Yeux bleus coiffés de noir



Segments en forme de lance



Segments de formes variées



8ème segment entièrement noir



8ème segment entièrement bleu



Photos : F. Barth, B. Bricault, A.-S. Salmon / SNPN

<i>Erythromma lindenii</i>	<i>Coenagrion sp.</i>
Critères communs	
Abdomen bleu annelé de noir Dessins noirs sur les segments abdominaux Traits noirs entre les sutures interpleurales*	
Critères visuels	
Yeux bleu vif contrastant avec la tête noire Quatre segments abdominaux lancéolés Huitième segment abdominal entièrement noir	Yeux bleus coiffés de noir Dessins des segments abdominaux variés Huitième segment abdominal toujours bleu
Habitat	
Eaux stagnantes à faiblement courantes, riches en végétation aquatique	Tout type d'habitats
Période de vol	
Fin mai à mi-septembre	Début mai à fin septembre

* Suture interpleurale : Ligne faisant la jonction entre les parties du thorax.