

## Uniques en leur genre ! – Les *Sympetrum* (½)

*Sympetrum danae* (Sympétrum noir)

Taille : 29-34 mm

Corps noir

Pattes noires

Trois points jaunes



CR

♂

*Sympetrum meridionale* (Sympétrum méridional)

Taille : 35-40 mm

Sutures thoraciques  
noires très peu  
marquées

Noir ne  
descendant pas  
le long des yeux

Pattes jaunâtres



LC

♀

*Sympetrum vulgatum* (Sympétrum vulgaire)

Taille : 35-40 mm

Noir descendant  
le long des yeux

Pattes noir et  
jaune



DD

♂

Photos : G. Larrègle, P. Rivallin / SEME ; C. Paris / AVEN du Grand-Voyeux ; J.-P. Delapré

| <i>Sympetrum danae</i>                 | <i>Sympetrum meridionale</i>   | <i>Sympetrum vulgatum</i>   |
|--|--|---|
| <b>Critères distinctifs principaux</b> |  |   |
| Corps noir<br>Pattes noires            | Corps rouge<br>Pattes noires rayées de jaune<br>Noir ne descendant pas le<br>long des yeux | Corps rouge<br>Pattes noires rayées de jaune<br>Noir descendant le long des<br>yeux |
| <b>Habitat</b>                         |  |   |
| Eaux tourbeuses et/ou<br>acides        | Eaux stagnantes de faible<br>profondeur, bien végétalisées                                 | Eaux stagnantes de tout type<br>bien végétalisées                                   |
| <b>Période de vol</b>                  |  |   |
| Fin juin à mi-octobre                  | Début juillet à mi-septembre   | Mi-juin à début novembre  |