

A ne pas confondre !

Les libellules bleutées

Anisoptères, Libellulidés

Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé)

LC

Taille : 44-50 mm



♂

Abdomen peu élargi, avec taches jaunes pas toujours visibles



Pas de tache noire à la base des ailes

LC

Libellula fulva (Libellule fauve)

Taille : 42-45 mm



♂

Yeux gris-bleu et face noire



Tache noire à la base de l'aile postérieure

Photos : F. Barth, A.-S. Salmon / SNPN

| <i>Orthetrum cancellatum</i> | <i>Libellula fulva</i> |
|---|--|
| Critères communs | |
| Pruine* sur l'abdomen, sauf à l'extrémité | |
| Critères visuels | |
| Pas de tache sur les ailes Marques jaunes pouvant être visibles sur le côté de l'abdomen | Tache noire à la base des ailes postérieures Yeux gris-bleu Face noire |
| Habitat | |
| Eaux stagnantes à faiblement courantes, aux berges généralement dépourvues de végétation | Rivières et ruisseaux à courant lents, canaux, étangs, fossés, bras morts |
| Période de vol | |
| Mi-mai à mi-octobre | Mi-mai à fin août |

* Pruine : Couche cireuse bleutée qui recouvre parfois le thorax et l'abdomen des Odonates.